


KAJIAN PENEKATAN UNTUK MEMPERKIRAKAN KONTRIBUSI PEUBAH TERHADAP STATISTIK HOTELLING

**Dini Prihartati
1211100107**

**Pembimbing: 1. Dra. Farida Agustini Widjajati, MS.
2. Dian Winda Setyawati, S.Si, M.Si**

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**SURABAYA
2015**



Abstrak

Statistik Hotelling sering digunakan dalam pengendalian kualitas proses. Peta kendali Statistik Hotelling pada dasarnya mempunyai tujuan utama untuk peningkatan dan pemeliharaan kualitas dengan menstabilkan proses tersebut. Beberapa pendekatan berbeda pernah diusulkan untuk memperkirakan kontribusi peubah terhadap Statistik Hotelling. Pendekatan sebelumnya menggunakan *Principal Component Analysis* (PCA), menginterpretasikan hasil yang berasal dari analisis peubah laten (peubah *unobserved*). Pada Tugas Akhir ini dibahas mengenai pendekatan berdasarkan *Nearest in Control Neighbor* (NICN) terhadap titik pengamatan. Untuk mendapatkan kontribusi peubah Statistik Hotelling digunakan perhitungan $c_{ij} = |x_{ij,NICN} - x_{ij}|$. Perbandingan yang diperoleh adalah hasil perhitungan peta kendali Statistik Hotelling menggunakan prinsip NICN terkendali secara mean proses setelah pengamatan *out of control* dihilangkan dan dapat diketahui peubah yang merupakan penyebab pengamatan *out of control*, sedangkan menggunakan Statistik Hotelling biasa tidak dapat diketahui peubah yang merupakan penyebab pengamatan *out of control*.

Kata kunci: NICN, Pengendalian Kualitas Proses, Peta Kendali, Statistik Hotelling.



Latar Belakang Masalah

Rumusan Masalah

Batasan Masalah


Tujuan

Manfaat



Minangkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jumlah produk barang dan jasa

Kegiatan produksi barang dan jasa juga meningkat



Ada hasil produksi yang tidak sesuai standar

Contohnya Didalam industri kimia

Temperatur

Tekanan


Konsentrasi




Teknik statistik yang mengontrol suatu proses, menggunakan diagram kontrol.

Pendekatan untuk memperkirakan kontribusi peubah terhadap Statistik Hotelling

Ditemukan Titik penyebab Proses tak terkendali




**Latar Belakang
Masalah****Rumusan
Masalah****Batasan
Masalah****Tujuan****Manfaat**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mendapatkan model pendekatan untuk memperkirakan kontribusi peubah terhadap Statistik Hotelling?


3.Bagaimana perbandingan hasil perhitungan Statistik Hotelling dan Statistik Hotelling menggunakan prinsip NICN?

2. Bagaimana hasil perhitungan Statistik Hotelling dan Statistik Hotelling menggunakan prinsip Nearest In Control Neighbor (NICN) berdasarkan data studi kasus dari literatur?

**Latar Belakang
Masalah****Rumusan
Masalah****Batasan
Masalah****Tujuan****Manfaat**

Batasan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian Tugas Akhir ini terbatas, antara lain:




**Latar Belakang
Masalah****Rumusan
Masalah****Batasan
Masalah****Tujuan****Manfaat**

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari usulan Tugas Akhir ini adalah:

1. Mencari model pendekatan baru untuk memperkirakan kontribusi peubah terhadap Statistik Hotelling.

2. Mendapatkan hasil perhitungan Statistik Hotelling dan Statistik Hotelling berdasarkan prinsip NICN menggunakan data studi kasus dari literatur.

3. Mendapatkan perbandingan hasil perhitungan Statistik Hotelling dan Statistik Hotelling menggunakan prinsip NICN.



Latar Belakang Masalah


Rumusan Masalah

Batasan Masalah

Tujuan

Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari Tugas Akhir ini adalah sebagai rujukan untuk mengetahui kontribusi peubah terhadap Statistik Hotelling. Besar kontribusi berguna dalam mengidentifikasi peubah penyabab *out of control*, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk proses perbaikan kualitas proses di masa yang akan datang.



Pendekatan

Uji Korelasi

Uji Distribusi
Normal
Multivariat

Peta Kendali
Multivariat
Statistik
Hotelling

A. Nearest In Control Neighbor (NICN)

Algoritma *Nearest In Control Neighbor* (NICN) adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Dengan meminimumkan Mahalanobis *Distance* yang digunakan sebagai fungsi objektif akan diperoleh titik NICN yang minimum [8]. Berikut adalah rumus Mahalanobis *Distance* :

$$d_i^2 = (\mathbf{x}_{NICN} - \mathbf{x})^T \mathbf{S}^{-1} (\mathbf{x}_{NICN} - \mathbf{x}); i = 1, 2, \dots, n \quad (1)$$


dengan

d_i^2 : Mahalanobis *Distance*

\mathbf{S}^{-1} : Nilai invers dari matriks varian kovarian sample

\mathbf{x}_{NICN} : Vektor tetangga terdekat

\mathbf{x} : Vektor pengamatan



Pendekatan

Uji Korelasi

Uji Distribusi Normal Multivariat

Peta Kendali Multivariat Statistik Hotelling

B. Pengali Lagrange

Sebagaimana dijelaskan dalam buku Desineni S. Naidu [6], langkah optimasi menggunakan Pengali Lagrange dalam proses optimasi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Lagrange Pembentukan

Fungsi pengali Lagrange didefinisikan sebagai berikut:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(x_1(t), x_2(t), \dot{x}_1(t), \dot{x}_2(t), \lambda(t), t)$$

Dengan fungsi objektif dan batas kendala (*constraint*)

$$V(x_1(t), x_2(t), \dot{x}_1(t), \dot{x}_2(t), t)$$

$$g(x_1(t), x_2(t), \dot{x}_1(t), \dot{x}_2(t), t) = 0$$

dan kondisi titik akhir

$$x_1(t_0) = x_{10}; \quad x_2(t_0) = x_{20}$$

$$x_1(t_f) = x_{1f}; \quad x_2(t_f) = x_{2f}$$

sehingga diperoleh fungsi Lagrange dengan $\lambda(t)$ adalah pengali Lagrange sebagai berikut:

$$\mathcal{L} = V(x_1(t), x_2(t), \dot{x}_1(t), \dot{x}_2(t), t) + \lambda(t)g(x_1(t), x_2(t), \dot{x}_1(t), \dot{x}_2(t), t) \quad (2)$$


2. Nilai optimum dari Persamaan (2) dapat dicari dengan memformulasikan masing-masing derivatif parsial pertamanya sama dengan nol, yaitu:

$$\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} \right)_* - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_1} \right) = 0$$

$$\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} \right)_* - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_2} \right) = 0$$

$$\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} \right)_* - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\lambda}} \right) = 0$$

(3)



Pendekatan

Uji Korelasi

Uji Distribusi
Normal
Multivariat

Peta Kendali
Multivariat
Statistik
Hotelling

C. Turunan Parsial Matriks Terhadap Vektor

Suatu fungsi linear f terbentuk dari $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ dimana \mathbf{A} adalah matriks simetri dan \mathbf{x} merupakan vektor kolom dituliskan sebagai berikut:


$$y = f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i x_j a_{ij}$$

Untuk menghitung turunan parsial dari $y = f(\mathbf{x})$ terhadap vektor kolom \mathbf{x} berdasarkan Teorema yang di ambil dari buku *Miscellaneous Concepts Of Matrix Algebra* [7].

$$\frac{\partial y}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial y}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial y}{\partial x_p} \end{bmatrix} = (\mathbf{A} + \mathbf{A}^T) \mathbf{x} = 2\mathbf{A}\mathbf{x} \quad (4)$$

dengan

$$\begin{aligned} y = & a_{12}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \cdots + a_{1p}x_1x_p + a_{21}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 \\ & + \cdots + a_{2p}x_2x_p + a_{p1}x_1x_p + a_{p2}x_2x_p + \cdots + a_{pp}x_p^2. \end{aligned}$$



Pendekatan

Uji Korelasi

Uji Distribusi
Normal
Multivariat

Peta Kendali
Multivariat
Statistik
Hotelling

D. Besar Kontribusi dan Batas Standar Kontribusi

Besar kontribusi masing-masing peubah dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut [8]:

$$c_{ij} = |x_{ij, \text{NICN}} - x_{ij}| \quad (5)$$

dengan


c_{ij} : Kontribusi sampel ke- i pada peubah ke- j

$x_{ij, \text{NICN}}$: NICN sampel ke- i pada peubah ke- j

x_{ij} : Nilai data sampel ke- i pada peubah ke- j

Untuk menunjukkan peubah penyebab *out of control* maka dihitung batas standar kontribusi titik NICN. Batas standar kontribusi tersebut digunakan sebagai pembanding yang diperoleh menggunakan informasi dari mean (\bar{c}_j), standar deviasi (s_j) dari peubah NICN dan estimator (β) [8], yaitu:

$$\tau_j = \bar{c}_j + \alpha s_j \quad (6)$$



Pendekatan

Uji Korelasi

Uji Distribusi
Normal
MultivariatPeta Kendali
Multivariat
Statistik
Hotelling

Untuk mengkaji koefisien korelasi sampel dari data hasil pengukuran, diberikan oleh persamaan [6]:

$$r_{X_j X_k} = \frac{n(\sum_{i=1}^n x_{ij} x_{ik}) - (\sum_{i=1}^n x_{ij})(\sum_{i=1}^n x_{ik})}{\sqrt{n(\sum_{i=1}^n x_{ij}^2) - (\sum_{i=1}^n x_{ij})^2} \sqrt{n(\sum_{i=1}^n x_{ik}^2) - (\sum_{i=1}^n x_{ik})^2}} \quad (7)$$

Jika terdapat peubah sebanyak p , didefinisikan matriks korelasi sampel (r) sebagai berikut:

$$r = \begin{bmatrix} r_{X_1 X_1} & r_{X_1 X_2} & \dots & r_{X_1 X_p} \\ r_{X_2 X_1} & r_{X_2 X_2} & \dots & r_{X_2 X_p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{X_p X_1} & r_{X_p X_2} & \dots & r_{X_p X_p} \end{bmatrix} \quad (8)$$

Hipotesa:

$H_0: \rho = 0$ (Tidak terdapat korelasi antar peubah)

$H_1: \rho \neq 0$ (Terdapat korelasi antar peubah)

Menghitungan statistik uji menggunakan persamaan:

$$T = \frac{(n-1)}{(1-\bar{r})^2} \left[\sum_{j < k} (r_{jk} - \bar{r})^2 - \hat{\gamma} \sum_{k=1}^p (\bar{r}_k - \bar{r})^2 \right] \quad (9)$$

dimana:


\bar{r}_k : Rata-rata dari elemen yang bukan elemen diagonal utama pada kolom k pada matriks korelasi sampel.

\bar{r} : Rata-rata keseluruhan dari elemen matriks segitiga bawah yang bukan diagonal utama pada matriks korelasi sampel

r_{kj} : Nilai koefisien korelasi $r_{X_j X_k}$ dimana $j \neq k$

p : Banyaknya peubah

Daerah penolakan adalah jika statistik uji $T > \chi_{\frac{(p+1)(p-2)}{2}}^2(\alpha)$ maka H_0 ditolak, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antar peubah.



Pendekatan

Uji Korelasi

Uji Distribusi
Normal
MultivariatPeta Kendali
Multivariat
Statistik
Hotelling

Berikut merupakan pengujian distribusi normal multivariat.

Hipotesa:

H_0 : Data berdistribusi normal multivariat

H_1 : Data tidak berdistribusi normal multivariat

Dihitung nilai jarak kuadrat dengan rumus:

$$d_i^2 = (x_i - \bar{X})' S^{-1} (x_i - \bar{X}); i = 1, 2, \dots, n \quad (10)$$

dan dihitung nilai $\chi^2_{(p; \frac{i-0,5}{n})} = q_i; i = 1, 2, \dots, n$

dengan

p : Banyak peubah

n : Banyak sampel


d_i^2 : Mahalanobis Distance

S^{-1} : Nilai invers dari matriks varian kovarian sample

\bar{X} : Vektor rata-rata peubah

x_i : Vektor sampel ke- i

Data dikatakan berdistribusi normal multivariat atau dapat dikatakan gagal menolak H_0 apabila terdapat minimal 50% nilai $d_i^2 \leq \chi^2_{(p; 0,5)}$ dan hasil dari scatter plot berupa garis lurus [8].



Pendekatan

Uji Korelasi

Uji Distribusi
Normal
MultivariatPeta Kendali
Multivariat
Statistik
Hotelling

Jika data dalam pengamatan tidak terdapat subgrup atau data bersifat individu maka digunakan peta kendali statistik Hotelling individu. sebagai berikut [6]:

$$T_i^2 = (x_i - \bar{X})' S^{-1} (x_i - \bar{X}); i = 1, 2, \dots, n \quad (11)$$

dengan

n : Banyak sampel yang terkendali secara variance

T_i^2 : Statistik hitung peta kendali Statistik Hotelling

S^{-1} : Nilai invers dari matriks varian kovarian sample

\bar{X} : Vektor rata-rata peubah


x_i : Vektor sampel ke- i

Batas kendali untuk individual Statistik Hotelling dengan sampel kurang dari 100, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$BKA = \left(\frac{p(n+1)(n-1)}{n^2 - np} \right) F_{\alpha, p, n-p} \quad (12)$$

$$BKB = 0$$

p merupakan banyak peubah, dengan n – sampel menggunakan distribusi F.



Pendekatan

Uji Korelasi

Uji Distribusi
Normal
Multivariat

Peta Kendali
Multivariat
Statistik
Hotelling

Studi Kasus

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sanchez (2012), tetangga terdekat dari titik pengamatan tersebut diperoleh berdarkan prinsip NICN yang dinyatakan sebagai masalah optimasi. Teori optimasi yang digunakan adalah pengali Lagrange. Dengan meminimumkan Mahalanobis *Distance* dapat diperoleh titik NICN yang minimum. Fungsi objektif dalam penyelesaian masalah optimasi ini yaitu:

$$\min(x_{NICN} - \bar{x})^T \psi^{-1} (x_{NICN} - \bar{x}) \quad (13)$$

dengan fungsi kendala

$$\begin{aligned} x_{NICN}^T R^{-1} x_{NICN} &= BKA \\ BKA - x_{NICN}^T R^{-1} x_{NICN} &= 0 \end{aligned} \quad (14)$$

dengan


x_{NICN} : Vektor tetangga terdekat x_{NICN}

\bar{x} : Vektor sampel x

ψ^{-1} : Matriks invers varian kovarian sampel

R^{-1} : Matriks invers korelasi

BKA : Batas kendali atas Statistik Hotelling Pesamaan (11)



Pendekatan

Uji Korelasi

Uji Distribusi
Normal
Multivariat

Peta Kendali
Multivariat
Statistik
Hotelling

Studi Kasus

Pada kasus optimasi parameter Statistik Hotelling, diasumsikan $\psi = R$, jika data yang digunakan data sampel dengan matriks varian kovarian sampel ψ . Fungsi Lagrange yang terbentuk merujuk pada Persamaan (2) adalah

$$\mathcal{L} = (\mathbf{x}_{NICN} - \mathbf{x})^T \psi^{-1} (\mathbf{x}_{NICN} - \mathbf{x}) + \lambda (BKA - \mathbf{x}_{NICN}^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{x}_{NICN})$$

dapat ditulis juga sebagai:

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \mathbf{x}_{NICN}^T \psi^{-1} \mathbf{x}_{NICN} + \mathbf{x}^T \psi^{-1} \mathbf{x} - 2\mathbf{x}^T \psi^{-1} \mathbf{x}_{NICN} \\ &\quad - \lambda (\mathbf{x}_{NICN}^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{x}_{NICN} - BKA) \end{aligned}$$


Karena parameter optimum yang dicari adalah \mathbf{x}_{NICN} maka dihitung turunan parsial pertama terhadap peubah \mathbf{x}_{NICN} dan pengali Lagrange. Pada kasus ini tidak terdapat $\dot{\mathbf{x}}_{NICN}$, merujuk pada Persamaan (3), sehingga

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{x}_{NICN}} = 0 \text{ dan } \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0$$

Menggunakan Persamaan (4), diperoleh

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{x}_{NICN}} = 2\psi^{-1} \mathbf{x}_{NICN} - 2\lambda \mathbf{R}^{-1} \mathbf{x}_{NICN} - 2\psi^{-1} \mathbf{x} = 0 \quad (15)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = \mathbf{x}_{NICN}^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{x}_{NICN} - BKA = 0 \quad (16)$$



Pendekatan

Uji Korelasi

Uji Distribusi Normal Multivariat

Peta Kendali Multivariat Statistik Hotelling

Studi Kasus

Nilai tetangga terdekat dari titik pengamatan disebut titik NICN, dipilih berdasarkan prinsip jarak Mahalanobis dan diasumsikan $\psi = R$. Persamaan (15) dapat ditulis dengan

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x_{NICN}} &= 2R^{-1}x_{NICN} - 2\lambda R^{-1}x_{NICN} - 2R^{-1}x = 0 \\ 2(1-\lambda)R^{-1}x_{NICN} - 2R^{-1}x &= \\ (1-\lambda)x_{NICN}R^{-1} &= xR^{-1} \\ (1-\lambda)x_{NICN} &= x \\ x_{NICN} &= \frac{x}{(1-\lambda)} \\ b &= \frac{1}{(1-\lambda)} \end{aligned}$$

sedemikian hingga

Jika dimisalkan

maka x_{NICN} dinyatakan dalam vektor sampel dan pengali Lagrange yaitu:


$$x_{NICN} = bx. \quad (17)$$

Dengan mensubsitusikan Persamaan (17) ke Persamaan (16),

$$\begin{aligned} bx^T R^{-1} bx - BKA &= 0 \\ b^2(x^T R^{-1} x) &= BKA \\ x^T R^{-1} x &= BKA \end{aligned} \quad (18)$$

$$\begin{aligned} b^2(T_x^2) &= BKA \\ b^2 &= \frac{BKA}{T_x^2} \end{aligned} \quad (19)$$

Nilai optimum Statistik Hotelling dihitung menggunakan Persamaan (13) dengan titik NICN yang diperoleh menggunakan Persamaan (17). Besar kontribusi peubah Statistik Hotelling dan batas standar kontribusi masing-masing peubah dihitung berdasarkan Persamaan (5) dan Persamaan (16).



Pendekatan


Uji KorelasiUji Distribusi
Normal
MultivariatPeta Kendali
Multivariat
Statistik
Hotelling

Studi Kasus

Matriks korelasi data sampel yang ada pada Lampiran, diperoleh berdasarkan Persamaan (7) dan Persamaan (8) adalah sebagai berikut:

$$r = \begin{bmatrix} 1 & 0,728 & 0,000 & 0,129 \\ 0,728 & 1 & 0,147 & 0,436 \\ 0,000 & 0,147 & 1 & 0,528 \\ 0,129 & 0,436 & 0,528 & 1 \end{bmatrix}$$

Statistik uji yang diperoleh berdasarkan Persamaan 9 $T = 11,359 > \chi^2_5(0,05) = 11,07$ dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antar peubah X_1, X_2, X_3 , dan X_4 .




Pendekatan

Uji Korelasi

Uji Distribusi
Normal
MultivariatPeta Kendali
Multivariat
Statistik
Hotelling

Studi Kasus

Berdasarkan pengujian distribusi normal multivariat nilai d_i^2 yang kurang dari $\chi_{(4;0,5)}^2$ lebih besar dari 50% yaitu 90% dan hasil dari plot berupa garis lurus maka dapat disimpulkan data peubah X_1, X_2, X_3 , dan X_4 mengikuti sebaran distribusi normal multivariat.



Pendekatan

Uji Korelasi

Uji Distribusi
Normal
MultivariatPeta Kendali
Multivariat
Statistik
Hotelling


Studi Kasus

Pada peta kendali Statistik Hotelling batas kendali yang digunakan adalah sesuai dengan Persamaan 12, dengan $p = 4$, $n = 20$, dan $F_{0,05,4,16} = 3,01$

$$BKA = \left(\frac{4(21)(19)}{20^2 - (20)(4)} \right) 3,01 = 15,02$$

$$BKB = 0$$

dan nilai median sebesar 3,61. Pada peta kendali Statistik Hotelling tidak terdapat data yang *out of control* atau dengan kata lain peta kendali Statistik Hotelling telah terkendali secara *mean* proses sehingga tidak perlu penghapusan pengamatan *out of control*



Pendekatan

Uji Korelasi

Uji Distribusi
Normal
MultivariatPeta Kendali
Multivariat
Statistik
Hotelling

Studi Kasus

1. Dihitung T_x^2 masing-masing sampel menggunakan Persamaan (18). Misal untuk sampel pertama,

$$T_x^2 = [4 \quad 3 \quad 1 \quad 2] \begin{bmatrix} 4,9211 & 2,5000 & 0,0000 & 0,2842 \\ 2,5000 & 2,3974 & 0,4461 & 0,6703 \\ 0,0000 & 0,4461 & 3,8493 & 1,0280 \\ 0,2842 & 0,6703 & 1,0280 & 0,9847 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$


$$= 18,7947$$

Nilai T_x^2 sampel ke-2 s.d. sampel ke-20 dapat dilihat pada Tabel 1.

2. Dihitung nilai b yang memuat nilai pengali Lagrange menggunakan Persamaan (19). Untuk sampel pertama, hasil perhitungan b_1 s.d. b_{20} dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Tahap 1 dan Tahap 2

| i | $T_{x,i}^2$ | b_i | i | $T_{x,i}^2$ | b_i |
|----|-------------|--------|----|-------------|--------|
| 1 | 18,7947 | 0,9084 | 11 | 73,5324 | 0,4593 |
| 2 | 34,6518 | 0,6690 | 12 | 45,4375 | 0,5843 |
| 3 | 75,8499 | 0,4522 | 13 | 108,2379 | 0,3785 |
| 4 | 90,4754 | 0,4140 | 14 | 27,9869 | 0,7444 |
| 5 | 85,9226 | 0,4249 | 15 | 43,8894 | 0,5945 |
| 6 | 72,0825 | 0,4639 | 16 | 53,3314 | 0,5393 |
| 7 | 45,0839 | 0,5865 | 17 | 50,0233 | 0,5568 |
| 8 | 104,7003 | 0,3849 | 18 | 81,6751 | 0,4358 |
| 9 | 14,6441 | 1,0291 | 19 | 51,6784 | 0,5478 |
| 10 | 26,4238 | 0,7661 | 20 | 78,8796 | 0,4434 |



Pendekatan

Uji Korelasi

Uji Distribusi
Normal
MultivariatPeta Kendali
Multivariat
Statistik
Hotelling

Studi Kasus

3. Dihitung x_{NICN} optimum, merujuk pada Persamaan (17), untuk pengamatan pertama,


$$x_{NICN,1} = 0,9084 \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3,5735 \\ 2,6801 \\ 0,8934 \\ 1,7867 \end{bmatrix}$$

4. Dihitung nilai minimum Statistik Hotelling berdasarkan Persamaan (13). Terdapat Nilai T^2_{min} yang melebih BKA 12,05 yaitu pada pengamatan ke-13 dengan nilai $T^2_{min} = 15,12$ dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai kontribusi masing-masing peubah dan nilai T^2

| i | c_{i1} | c_{i2} | c_{i3} | c_{i4} | T^2 |
|-----|----------|----------|----------|---------------|----------------|
| 1 | 0,3663 | 0,2747 | 0,0916 | 0,1832 | 0,0761 |
| 2 | 1,6549 | 1,3239 | 0,6619 | 1,1584 | 1,9361 |
| 3 | 4,3824 | 3,8346 | 1,6434 | 2,1912 | 8,4077 |
| 4 | 4,6877 | 3,5158 | 2,9298 | 2,3438 | 9,3041 |
| 5 | 5,1762 | 4,0259 | 1,1503 | 1,7254 | 8,2240 |
| 6 | 3,2168 | 1,6084 | 2,6807 | 1,6084 | 5,5116 |
| 7 | 2,4808 | 2,0673 | 1,2404 | 1,0337 | 2,3375 |
| 8 | 6,1511 | 4,9209 | 1,2302 | 1,8453 | 11,3796 |
| 9 | 0,0583 | 0,0874 | 0,0437 | 0,0991 | 0,0022 |
| 10 | 0,9354 | 0,9354 | 0,7016 | 0,7016 | 0,6921 |
| 11 | 3,2444 | 3,2444 | 3,2444 | 2,1629 | 7,2262 |
| 12 | 2,7024 | 1,8709 | 0,0000 | 0,8315 | 2,2515 |
| 13 | 5,5931 | 4,9716 | 3,1073 | 3,1073 | 15,1259 |
| 14 | 1,0223 | 1,2778 | 0,2556 | 0,2556 | 0,8359 |
| 15 | 1,6221 | 2,4332 | 1,2166 | 2,0277 | 5,2154 |
| 16 | 2,7643 | 3,2250 | 0,9214 | 1,8429 | 5,8703 |
| 17 | 1,1079 | 1,9943 | 2,6590 | 1,7727 | 4,0255 |
| 18 | 2,8211 | 3,1032 | 3,9496 | 1,6927 | 7,2109 |
| 19 | 3,1651 | 2,4869 | 0,4522 | 1,1304 | 3,3391 |
| 20 | 4,4526 | 2,7829 | 1,6697 | 1,6697 | 6,3258 |

$T_{c=0,05}^2 = 15,02$. Nilai yang dihitamkan merupakan titik yang *out of control*.



Pendekatan

Uji Korelasi


Uji Distribusi
Normal
MultivariatPeta Kendali
Multivariat
Statistik
Hotelling

Studi Kasus

Selanjutnya dihitung nilai kontribusi masing-masing peubah menggunakan Persamaan (5) dan digunakan Persamaan (6) untuk menghitung batas standar kontribusi setiap peubah ke- j ($j = 1, 2, \dots, p$). Nilai τ_j diperoleh sebagai berikut

$$\tau_j = [6,4917 \quad 5,3270 \quad 3,9482 \quad 3,0819].$$

Dengan menggunakan prinsip NICN dapat diketahui penyebab pengamatan ke-13 berada diluar batas kendali, yaitu pada peubah X_4 . Peubah X_4 dapat dijadikan acuan dalam proses perbaikan selanjutnya. Setalah pengamatan *out of control* dihilangkan, banyaknya data adalah sebanyak 19 data dan telah terkendali dalam *mean* proses dengan BKA sebesar 17,57.



Pendekatan


Uji Korelasi

Uji Distribusi
Normal
MultivariatPeta Kendali
Multivariat
Statistik
Hotelling

Studi Kasus

Tabel 3. Data oleh De Maesschalck (Sanchez , 2012)


| i | X_1 | X_2 | X_3 | X_4 | X_1 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 |
| 2 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | 3,50 | 5,00 |
| 3 | 8,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 |
| 4 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 8,00 |
| 5 | 9,00 | 7,00 | 2,00 | 3,00 | 9,00 |
| 6 | 6,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 6,00 |
| 7 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 2,50 | 6,00 |
| 8 | 10,00 | 8,00 | 2,00 | 3,00 | 10,00 |
| 9 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 3,40 | 2,00 |
| 10 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
| 11 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 |
| 12 | 6,50 | 4,50 | 0,00 | 2,00 | 6,50 |
| 13 | 9,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 9,00 |
| 14 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 15 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 |
| 16 | 6,00 | 7,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 |
| 17 | 2,50 | 4,50 | 6,00 | 4,00 | 2,50 |
| 18 | 5,00 | 5,50 | 7,00 | 3,00 | 5,00 |
| 19 | 7,00 | 5,50 | 1,00 | 2,50 | 7,00 |
| 20 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 8,00 |



Berdasarkan Analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan: Pendekatan untuk memperkirakan kontribusi peubah Statistik Hotelling menggunakan $c_{ij} = |x_{ij,NICN} - x_{ij}|$.

2. Dari hasil perhitungan Statistik Hotelling menggunakan data studi kasus dari literatur sebanyak 20 pengamatan dan empat peubah, peta kendali terkendali secara *mean* proses tanpa penghapusan pengamatan yang *out of control* dengan BKA sebesar 15.02. Perhitungan Statistik Hotelling berdasarkan prinsip NICN terkendali secara *mean* proses setelah satu pengamatan *out of control* dihilangkan dengan BKA sebesar 17.57.

3. Perbandingan yang diperoleh adalah perhitungan menggunakan Statistik Hotelling biasa tidak dapat diketahui peubah yang merupakan penyebab dari pengamatan *out of control*, sedangkan hasil perhitungan Statistik Hotelling menggunakan prinsip NICN dapat diketahui peubah yang merupakan penyebab pengamatan *out of control*. Peubah tersebut dapat dijadikan acuan dalam proses perbaikan selanjutnya.



- [1] Aliansyah, M.I. 2013. *Statistika Pengendalian Buku Mutu Dengan Metode T^2 Hotelling Data Subgroup*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- [2] R.I. Mason, N.D Tracy, J.C. Young. 1997. "A Pratical Approach for Interpreting Multivariate T^2 Control Chart Signals". *Journal of Quality Technology*. 29, 396-406.
- [3] R.I. Alvarez, A. Brandolin, M.C. Sanchez. 2007. "On The Variable Contributions to The D-statistic". *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*. 88, 189-196.
- [4] J.E. Jackson. 1991. "A User's Guide To Principal Components". Jon Willey & Sons, Inc. United States of America.
- [5] Sanchez, M. C. 2012. "A New Approach to Estimate Variable Contributions to Hottelling's Statistic". *Jurnal of Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*. 118, 120-126.
- [6] Naidu, D.S. 2003. *Optimal Control Systems*. America: CRC Press LLC
- [7] Anonim. 2006. "Miscallaneou Concepts Of Matrix Algebra".
https://www.google.co.id/Matrix_Algebra.pdf&ei=hiJuVZuXDJShuQTnuoHQAg&usg=AFQjCNEuHY7jesuCOLUhuydNPXIjRaTalA&bvm=bv.94911696,d.c2E/, diakses pada tanggal 30 April 2015 pukul 17.51). 2006.
- [8] America: Arizona State University.Jonhson, Richard. Dean Wichern. 2002. *Applied Multivariat Statistical Analysis, 5th ed.*New Jersey : Prentice Hall.